

# 薬について

## MEDICATIONS



## なぜこうなってしまうのか？

アルツハイマー病や認知症の人に  
見られる傾向：

- 薬の服用を忘れる。
- 薬を飲んだ事を忘れて何度も服用する。
- 間違った薬を飲んだり、飲む量が多すぎて、具合が悪くなったり中毒を起こす。



844.HELP.ALZ  
AlzheimersLA.org

© 2022 Alzheimer's Los Angeles  
Supported by DHHS, ACL  
(#90AL0002-01-00 & 90ADPI0049)



アルツハイマー病や認知症の人は薬の服用に手助けが必要な場合があります。薬の飲み過ぎ、または少なすぎ、服用の手引きに従わないなど、危険につながる場合があります。

## あなたにできることは？

### 注意深く見守る

- 適量を適時に服用しているか、服用方法の指示に従っているかをきちんと確認する。
- 薬の入ったピルケースやカップをカウンターに置きっぱなしにしない。
- 薬を服用する時に一人にしない。

### 薬を安全な場所に収納する

- すべての薬は見えない所、または手の届かない所に収納する。

### 受診している全ての医者と話す

- 処方せん医に相談せず勝手に薬を中断しない。
- 袋や箱に入ったすべての薬を各医師の受診時に持参する。
  - ビタミン剤や漢方薬、お茶、クリーム、ドラッグストアで購入したその他の薬も含む
- 薬を食べ物やドリンクに混ぜてもいいか医者に確認する。
- この方法は薬を飲みたがらない場合に効果的。

**注意：**暴力的な態度やトイレの粗相などが突然起きた場合、すぐに医者に連絡しましょう。

- これらの変化は薬の副作用、または新しい疾患によって引き起こされる可能性があります。