

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)
**Conditions d'éligibilité avec l'âge et
Type de preuves**

Eligible Conditions With Age and Type of Evidence

Toutes les conditions d'invalidité doivent être antérieures à l'âge de 18 ans, se poursuivre indéfiniment et entraîner une limitation substantielle du fonctionnement adaptatif selon WAC 388-823.

Conditions d'éligibilité spécifiques à l'âge			
Condition	0 - 3	4 - 19	20 ans et plus
Retards développementaux	X	X	
Déficience Intellectuelle (ID)		X	X
Paralysie cérébrale		X	X
Épilepsie		X	X
Autisme		X	X
Autre trouble neurologique ou autre semblable à une déficience		X	X

Tests acceptés comme preuve de limitation substantielle	
Tests cognitifs	Évaluations adaptatives
<ul style="list-style-type: none"> Stanford-Binet Wechsler Intelligence Scales (WISC) Differential Abilities Scale (DAS) Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) Das-Naglieri Cognitive Assessment System (CAS) Woodcock Johnson Test of Cognitive Abilities (WJ) Reynolds Intellectual Assessment Scales, 2e édition (RIAS 2) <p>Si vous souffrez d'une déficience auditive, si l'anglais n'est pas votre langue principale ou si vous n'êtes pas verbal, votre FSIQ peut être estimé à l'aide de l'un des tests ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> Échelle de performance internationale de Leiter révisée (Leiter-R) Échelles d'intelligence Wechsler (WISC, WAIS, WNV) Test complet de l'intelligence non verbale (C-TONI) Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) Indice d'échelle non verbal 	<ul style="list-style-type: none"> Échelles de comportement adaptatif Vineland (VABS) Échelles de comportement indépendant révisées (SIB-R) Inventaire pour la planification des clients et des organismes (PICA) Système d'évaluation adaptative du comportement (ABAS)

Diagnostic, diagnosticien et preuve requise de limitation substantielle		
Diagnostic	Diagnosticien	Limite substantielle
Retard développemental	Sans objet	Retards développementaux
Déficience intellectuelle	Psychologue autorisé ou psychologue scolaire certifié	Évaluation du fonctionnement adaptatif avec un score standard ≤ 69 , et Évaluation psychologique avec FSIQ ≤ 69 ou Stanford-Binet IV avec FSIQ ≤ 67
Paralysie cérébrale, ou Lésions cérébrales similaires causant une quadriplégie, une hémiplégie ou une diplégie	Médecin autorisé	Apparition avant l'âge de 3 ans, et Preuve de la nécessité d'une aide physique directe dans 2 des cas suivants : faire sa toilette, prendre son bain, manger, s'habiller, se déplacer ou communiquer
Épilepsie, crises épileptiques	Neurologue homologué	Les crise épileptiques sont incontrôlées et continues ou récurrentes, et Évaluation du fonctionnement adaptatif avec un score standard ≤ 69
Autisme, troubles autistiques (DSM-IV-TR-299.00), ou Trouble du spectre autistique (DSM-5)	Neurologue agréé par le conseil d'administration ; psychiatre agréé par le conseil d'administration ; psychologue agréé par le conseil d'administration ; pédiatre du développement et du comportement agréé par le conseil d'administration ; médecin agréé ou ARNP associé à un centre d'autisme, de développement ou d'excellence	Preuve d'apparition avant l'âge de 5 ans, évaluation du fonctionnement adaptatif avec un score standard ≤ 69 , et en cas de diagnostic DSM-5, un FSIQ ≤ 84 (ou une déclaration par écrit stipulant que votre autisme vous empêche d'effectuer un test)
Autre trouble neurologique ou autre semblable à une déficience	Médecin autorisé	Évaluation du fonctionnement adaptatif avec un score standard ≤ 69 , et FSIQ ≤ 77 ou Stanford-Binet IV avec FSIQ ≤ 75 , ou si moins de 20 ans, les scores dans les deux Broad Reading & Broad Math ≤ 69 peuvent remplacer le test FSIQ