

### DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

# 개인 및 가족 서비스 평가 내역서

## Individual and Family Services Assessment Worksheet WAC 제 388-828 장

### IFS 수준 및 서비스 수혜 숭인에 대한 설명

작성 지침: 제 II 부에, 해당 점수에 동그라미로 표하십시오. 결과 도표에 라인을 강조표시하십시오. 결과를 제 1 부의 요약 정보에 옮겨기재하십시오.

- 1 1 1 1 1 - 1			
제   부 = 요약 정보			
노인 및 장애 서비스 행정국은	일에 DDA 평가의 일부분으로 개인 및 가족 서비스(IFS) 평가	법을	
날짜			
사용하여(을)를 평가했습니다.			
이름	,		
참고 법안 WAC	범위	점수	
388-828-5060	보호감독 중증 점수		
388-828-5080	<u>-(빼기)</u> 연령에 따른 점수 조정		
388-828-5080	<u>=</u> 보호 <b>감독 지원 점수</b>		
388-828-5260	수혜자/의뢰인 보호/간호 능력에 대한 질문 점수		
388-828-5260	심한 스트레스 질문 점수		
388-828-5260	지속적인 보호/간호 가능성에 대한 질문 점수		
388-828-5280	간병인 위험 요소		
388-828-5300	주요 간병인 위험도		
388-828-5320	예비 간병인 유효성 점수		
388-828-5360	예비 간병인 위험도		
388-828-5580	가장 두드러진 문제행동 빈번도 점수		
388-828-5600			
388-828-5620	가장 두드러진 문제행동 심각도 점수		
388-828-5640	가장 두드러진 문제행동에 대한 간병인 지원 점수		
300-020-3040	행동 중중도		
388-828-9040(1)	비조정 IFS 등급		
388-828-9040(2) a 와 b	+(더하기) 해당될 경우 다른 간호/보호에 대한 조정 점수 (1점)		
388-828-9040	총 비조정 IFS 등급		
	0 1. 0 H 2 0 H		
	서비스 수혜 지속 숭인에 대한 결정		
388-828-5700	의료 중증도		
• 388-828-5440 - 15 세까지	ADL 지원 필요도		
• 388-828-5460 ~ 5480 - 16 세			
이상			
388-828-9060	개인 및 가족 서비스 평점		
388-828-9100	+(더하기) 의료 및 ADL 지원에 대한 조정 금액		
388-828-9120	<u>=</u> 조정된 가족 서비스 지원 평점		
388-828-9140	개인 및 가족 서비스 등급		
388-828-9140	개인 및 가족 서비스 숭인 금액		

### 제 II 부 - WAC 워크시트- IFS 등급 측정

#### DDA 보호 감독 중증도

WAC 388-828-5000 ~ WAC 388-828-5100 에 따라 IFS 는 DDA 보호 감독 중증도 및 연령에 따른 조정율의 다음 질문에 대한 답에 근거해 보호 감독 지원 점수를 0 에서 6 점으로 결정합니다.

수혜자/의뢰인이 깨어 있는 시간에 일반적으로 어떤 등급의 감독이 필요합니까? (WAC 제 388-828-5060 장 준수):

응답	용어 정의	점수
남에게 의존하지 않고 혼자 있을 수 있음	혼자 있을 수 있음. 가끔 잘못 판단할 수도 있으나 도우미(돕는 사람)가 주기적으로 있을 필요는 없음.	0
거의 혼자 있을 수 있음(예: 일주일 또는 그이상)	장시간 혼자 있을 수 있으나 도우미가 전화로 또는 직접 매주 방문할 필요가 있음.	1
주기적(예: 이틀에 한 번씩)	이틀씩 혼자 있을 수 있으나 도우미가 이틀에 한 번 전화로 또는 직접 확인할 필요가 있음.	2
감독(예: 반나절, 일정하지 않음)	몇 시간(2-4 시간)씩 혼자 독립적인 활동에 관여할 수 있으나 도우미가 매일 지도나 지원할 필요가 있음.	3
가까운 거리(예: 1~2 시간, 조직화)	단시간(1~2 시간)동안 혼자 있을 수 있음. 엄격히 조직화된 환경을 제공했음. 응급상황시 도우미가 신속하게 대응할 수 있음.	4
현장(예: 건물 내)	혼자 있을 수 없음. 최소한 수혜자/의뢰인이 깨어 있는 동안은 도우미가 항상 건물 내에 있어야 함.	5
시선 내/불러서 들리는 거리(예: 가까이서 관찰)	혼자 있을 수 없음. 수혜자/의뢰인이 깨어 있는 동안 도우미가 항시 같은 곳에 있거나 불러서 들리는 거리에 있어야 함.	6

DDA 는 WAC 388-828-5060 에 있는 1 번 질문에 대한 귀하의 감독 등급 점수를 위해 다음 연령에 따른 점수 조정을 적용합니다.

연령	연령에 따른 점수 조정:	
18 세 이상	점수는 감독 수준의 점수와 같음	
16-17 세	감독 수준의 점수에서 2를 뺌	
12-15 세	감독 수준의 점수에서 3을 뺌	
8-11 세	감독 수준의 점수에서 4를 뺌	
5-7 세	감독 수준의 점수에서 5 를 뺌	
0-4 세	감독 수준의 점수에서 6 을 뺌	
조정된 감독 등급의 점수가 마이너스일 경우 조정된 보호감독 중증도 점수는 0 에 해당된니다		

### DDA 간병인 상태 중증도

WAC 388-828-5120 ~ WAC 388-828-5360 에 따라 IFS 평가를 다음과 같이 결정합니다.

- 주요 간병인 위험도(없음, 낮음, 중간, 높음 또는 즉시) 및
- 예비 간병인 위험도(1, 2 또는 3).

IFS 평가는 다음 3 단계 방법을 사용하여 주요 간병인 위험도를 결정합니다.

• IFS 평가는 DDA 간병인 상태 중중도(WAC 388-828-5260(4)(5)(6))에서 다음 질문을 사용하여 수혜자/의뢰인의 점수를 결정합니다.

(4) 이러한 것들이 수혜자/의뢰인을 돌보는 데 얼마나 영향을 줍니까?

응답	점수
약간 또는 거의 영향을 받지 않음	0
영향을 받을 가능성이 있음, 구체적인 확증이 없음	1
보호/간호가 감소되었다는 확증이 있음	4
할 수 없음	9

(5) 수혜자/의뢰인이 다른 가족구성원에게 심한 스트레스를 야기합니까?

응답	점수
안정 및 건강함	0
스트레스가 있는 기미가 뚜렷하게 있음	4
실패의 위험성이 심함	9

(6) 수혜자/의뢰인을 얼마나 더 계속 돌볼 것으로 예상합니까?

응답	점수
2년 이상 더	0
6 개월에서 2 년	0
1~6개월	4
1 개월 이하	9

## 그 다음 간병인 위험요소는 WAC 388-828-5280(1)- (9)의 기준을 사용해 결정됩니다.

다음 기준에 부합할 경우:	간병인 위험요소:
(1) 6 번 질문에 대해 점수가 "1 개월 이하"일 경우.	간병인이 금방 그만 둘 위험이 있음
("수혜자/의뢰인을 얼마나 더 계속 돌볼 것으로 예상합니까?"),	
WAC 388-828-5260 참고	
(2) "비정규 간병인" 연락 역할을 할 관련인이아무도 CARE 시스템에 확정되지 않았음.	간병인이 없음, 한 명 필요함
(3) "정규 간병인" 연락 역할을 할 관련인이 아무도 CARE 시스템에 확정되지 않았음.	
(4) "예비 간병인" 연락 역할을 할 관련인이 아무도 CARE 시스템에 확정되지 않았음.	
(5) DDA 유급 서비스를 지원을 제공할 사람으로서 DDA 가 승인한 유급 서비스 제공인이 없음	
(6) WAC 388-828-5080 에 따라 조정된 보호감독 점수가 3 점 이상임	
(7) "주요 간병인" 연락 역할을 할 관련인이 CARE 시스템에 한 명 확정되어 있음	노인 간병인
(8) 주요 간병인의 연령이 70 세 이상임	
(9) 주요 간병인이 자택에 함께 거주함.	

#### 다음 차트에 위의 표에 있는 점수와 귀하의 간병인 위험요소를 사용해 귀하의 주요 간병인 위험 등급이 결정됩니다.

WAC 388-828-5240 의 다음 질문에 대한 점수			
4 번 질문에 대한 점수	5 번 질문에 대한 점수	6 번 질문에 대한 점수	간병인의 위험도
0	0	0	없음
0	0	4	중간
0	0	9	즉시
0	4	0	중간
0	4	4	중간
0	4	9	즉시
0	9	0	높음
0	9	4	높음
0	9	9	즉시
1	0	0	낮음
1	0	4	중간
1	0	9	즉시
1	4	0	중간
1	4	4	중간
1	4	9	즉시
1	9	0	높음
1	9	4	높음
1	9	9	즉시
4	0	0	중간
4	0	4	중간
4	0	9	즉시
4	4	0	중간
4	4	4	중간
4	4	9	즉시
4	9	0	높음
4	9	4	노으
4	9	9	즉시
9	0	0	높음
9	0	4	높음
9	0	9	즉시
9	4	0	높음
9	4	4	높음
9	4	9	즉시
9	9	0	노 <sub>우</sub>
9	9	4	노은
9	9	9	즉시

- 4, 5, 6 번 질문에 대한 최고 점수가 4 점 이하일 경우와 WAC 388-828-5280 의 "노인 간병인" 위험요소가 있을 경우 간병인의 위험도는 "중간"에 해당합니다.
- 간병인의 위험요소가 WAC 388-828-5280 의 "간병인 없음 및 한 명 필요함"일 경우, 4, 5, 6 번 질문에 대한 점수에 관계 없이 간병인의 위험도는 "즉시"입니다.

### 예비 간병인 위험 점수

IFS 평가 WAC 388-828-5320~388-828-5360 의 두 단계 측정법을 사용해 예비 간병인위험점수(1,2,또는 3)를 결정합니다.

1. IFS 평가는 WAC 388-828-5320 에 따라 예비 간병인 하위 측정법으로부터 다음 질문을 사용해 점수를 결정합니다.

어떤 상황일 경우 다른 간병인을 이용할 수 있습니까?

선택할 수 있는 응답	점수
정기적으로 보호	0
요청할 경우	2
응급상황에서만	4
이용할 수 있는 다른 간병인이 없음	9

2. 그 다음 IFS 평가는 예비 간병인(WAC 388-828-5360 준수)의 유효성을 확인한 후 예비 간병인의 위험도 점수를 결정합니다.

예비 간'	병인의 유효성이 다음에 해당될 경우:	위험도 점수:
(1)	예비 간병인 하위측정법의 1 번 질문에 대한 점수가 0~2 점에 의거해 예비 간병인을 정기적으로 또는 요청할 경우 이용할 수 있음	1 (위험율이 없음)
(2)	선택한 예비 간병인에 대해 상세 정보는 있으나 "수혜자/의뢰인과 함께 거주" 확인 네모칸이 체크되어 있지 않은것에 근거해 같이 살지 않는 사람으로 확인된 예비 간병인 한 사람을 확정했음	
(3)	예비 간병인 하위 측정도 1 번 질문에 대한 점수 4 점에 근거할 때 예비 간병인을 응급상황시에만 이용할 수 있음	2 (약간 위험함)
(4)	<b>모든</b> 사람에 대해 "수혜자/의뢰인과 함께 거주"로 선택해 예비 간병인으로 확정했음	,
(5)	예비 간병인 하위 측정도 1 번 질문에 대한 점수 9 점에 근거할 때 도움을 받을 수 있는 다른 간병인이 없음.	3 (높은 위험율)

## DDA 행동 중증도

WAC 388-828-5580 DDA 에서 어떻게 나의 가장 두드러진 행동문제의 빈도수를 결정합니까? 두드러진 어떤 행동문제가 있을 경우 DDA 는 다음 도표를 사용해 질문을 한 후, 응답에 따라 귀하의 가장 두드러진 행동문제의 빈도수를 결정합니다.

가장 두드러진 행동문제 발생 빈도수:	발생 빈도수에 대한 점수:
한 달에 한 번 이하 발생	희박
한 달에 1~3 번 발생	가끔
일주일에 1~4 번 발생	가끔
매일 1~3 번 발생	빈번
매일 4 번 이상 발생	빈번

WAC 388-828-5600 DDA 에서 어떻게 나의 가장 두드러진 행동문제의 심각도를 결정합니까? 두드러진 어떤 행동문제가 있을 경우 DDA 는 다음 도표에 따라 질문을 한 후 귀하와 응답자(들)의 응답에 따라 귀하의 가장 두드러진 행동문제의 심각도를 확정합니다.

가장 두드러진 행동문제의 특징:	심각도에 대한 점수:
비협조적인 행동, 부자유스러운 행동, 반복적인 행동 및/또는 집중적인 지원을 위해 시간이 필요할 수도 있지만, 행동자체가 공격적이고 자해적인 것은 아님.	소소한 사건
그대로 두면 시간이 지남에 따라 자신 및/또는 다른 사람의 생명을 위태롭게 할 수도 있는 행동임	위험 가능성
바로 개입을 하지 않으면 자신 및/또는 다른 사람의 생명을 위태롭게 할 수 있는 행동임.	생명 위협

WAC 388-828-5620 DDA 는 어떻게 간병인의 어떤 지원이 나의 가장 두드러진 행동문제를 제어하는 데 도움이 되는지 결정합니까? DDA 는 두드러진 어떤 행동문제를 제어하는 데 다음 도표를 사용해 질문을 한 후, 귀하와 응답자(들)의 응답에 따라 어떤 종류의 지원이 도움이 되는지를 결정합니다.

가장 두드러진 행동문제를 지원하기 위해 간병인이 제공한 도움	간병인의 도움에 대한 점수:
수혜자/의뢰인의 가장 두드러진 문제행동을 제어하는 데 아무런 도움이 필요하지 않다고 응답자가 보고함.	밤새 감독할 필요가 없음
때때로 감독할 필요는 있지만 수혜자/의뢰인의 가장 두드러진 행동문제를 제어하는 데 말로 다시 지시하면 된다고 응답자가 보고함.	구두로 다시 지시
때때로 팔다리 등 신체적 유도 필요 및/또는 가장 두드러진 행동문제를 제어하기 위해 간병인이 개입한다고 응답자가 보고함.	때때로 신체적 유도 또는 개입
가장 두드러진 행동문제를 제어하려면 항시 눈에 띄는 곳에 있어야 하고 한 두 사람이 신체적 제재를 가하거나 해당 장소로부터 이동을 해야 한다고 응답자가 보고함.	시야 감독 – 신체적 제재

WAC 388-828-5640 DDA 에서 어떻게 나의 행동 중증도를 결정합니까? DDA 는 다음 도표를 사용해 귀하의 행동문제 발생 빈번도, 심각도 및 간병인 지원 점수로 행동 중증도를 결정합니다.

빈번도에 대한 점수:	심각도에 대한 점수:	간병인 지원에 대한 점수	행동 중중도:
희박	소소함	없음	낮음
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	
		신체적 제재	
	위험 가능성	없음	
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	중간
		신체적 제재	높음
	생명 위협	없음	중간
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	높음
		신체적 제재	

빈번도에 대한 점수:	심각도에 대한 점수:	간병인 지원에 대한 점수	행동 중중도:
가끔	소소함	없음	낮음
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	
		신체적 제재	중간
	위험 가능성	없음	
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	
		신체적 제재	높음
	생명 위협	없음	중간
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	높음
		신체적 제재	
빈번	소소함	없음	낮음
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	중간
		신체적 제재	
	위험 가능성	없음	
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	높음
		신체적 제재	
	생명 위협	없음	
		구두로 다시 지시	
		신체적 유도 또는 개입	
		신체적 제재	

## 개인 및 가족 서비스 등급

## WAC 388-828-9040 DDA 는 어떻게 개인 및 가족 서비스 등급을 측정합니까?

1. DDA 는 다음 도표를 사용하여 개인 및 가족 서비스 등급을 결정합니다.

보호 감독 지원 등급이 다음에 해당될 경우:	주요 간병인 위험 등급:	예비 간병인 위험 점수:	행동 중증도:	수혜자의 비조정 IFS 등급:
0	없음	1	없음	1
0	없음	1	낮음	1
0	없음	1	중간	1
0	없음	1	높음	2
0	없음	2 또는 3	없음	1
0	없음	2 또는 3	낮음	1
0	없음	2 또는 3	중간	2

보호 감독 지원 등급이 다음에 해당될 경우:	주요 간병인 위험 등급:	예비 간병인 위험 점수:	행동 중증도:	수혜자의 비조정 IFS 등급:
0	없음	2 또는 3	높음	2
0	낮음	1	없음	1
0	낮음	1	낮음	1
0	낮음	1	중간	1
0	낮음	1	높음	2
0	낮음	2 또는 3	없음	1
0	낮음	2 또는 3	낮음	1
0	낮음	2 또는 3	중간	2
0	낮음	2 또는 3	높음	2
0	중간	1	없음	1
0	중간	1	낮음	1
0	중간	1	중간	1
0	중간	1	높음	2
0	중간	2 또는 3	없음	1
0	중간	2 또는 3	낮음	1
0	중간	2 또는 3	중간	2
0	중간	2 또는 3	높음	2
0	높음	1	없음	1
0	높음	1	낮음	1
0	높음	1	중간	2
0	높음	1	높음	2
0	높음	2 또는 3	없음	2
0	높음	2 또는 3	낮음	2
0	높음	2 또는 3	중간	2
0	높음	2 또는 3	높음	3
0	즉시	1	없음	1
0	즉시	1	낮음	1
0	즉시	1	중간	2
0	즉시	1	높음	2
0	즉시	2 또는 3	없음	2
0	즉시	2 또는 3	낮음	2
0	즉시	2 또는 3	중간	2
0	즉시	2 또는 3	노유	3
1	없음	1	없음	1
1	없음	1	낮음	1
1	없음	1	중간	1
1	없음	1	노유	2
1	없음	2 또는 3	없음	1
1	없음	2 또는 3	낮음	1
1	없음	2 또는 3	중간	2
1	없음	2 또는 3	노유	3
1	낮음	1	없음	1

보호 감독 지원 등급이 다음에 해당될 경우:	주요 간병인 위험 등급:	예비 간병인 위험 점수:	행동 중증도:	수혜자의 비조정 IFS 등급:
1	낮음	1	낮음	1
1	낮음	1	중간	1
1	낮음	1	높음	2
1	낮음	2 또는 3	없음	1
1	낮음	2 또는 3	낮음	1
1	낮음	2 또는 3	중간	2
1	낮음	2 또는 3	높음	3
1	중간	1	없음	1
1	중간	1	낮음	1
1	중간	1	중간	2
1	중간	1	높음	3
1	중간	2 또는 3	없음	1
1	중간	2 또는 3	낮음	2
1	중간	2 또는 3	중간	2
1	중간	2 또는 3	높음	3
1	높음	1	없음	2
1	높음	1	낮음	2
1	높음	1	중간	2
1	높음	1	높음	3
1	높음	2 또는 3	없음	2
1	높음	2 또는 3	낮음	2
1	높음	2 또는 3	중간	3
1	높음	2 또는 3	높음	4
1	즉시	1	없음	2
1	즉시	1	낮음	2
1	즉시	1	중간	2
1	즉시	1	높음	3
1	즉시	2 또는 3	없음	2
1	즉시	2 또는 3	낮음	2
1	즉시	2 또는 3	중간	3
1	즉시	2 또는 3	높음	4
2 또는 3	없음	1	없음	1
2 또는 3	없음	1	낮음	1
2 또는 3	없음	1	중간	2
2 또는 3	없음	1	높음	3
2 또는 3	없음	2 또는 3	없음	2
2 또는 3	없음	2 또는 3	낮음	2
2 또는 3	없음	2 또는 3	중간	2
2 또는 3	없음	2 또는 3	높음	4
2 또는 3	낮음	1	없음	1
2 또는 3	낮음	1	낮음	1
2 또는 3	낮음	1	중간	2

보호 감독 지원 등급이 다음에 해당될 경우:	주요 간병인 위험 등급:	예비 간병인 위험 점수:	행동 중증도:	수혜자의 비조정 IFS 등급:
2 또는 3	낮음	1	높음	3
2 또는 3	낮음	2 또는 3	없음	2
2 또는 3	낮음	2 또는 3	낮음	2
2 또는 3	낮음	2 또는 3	중간	2
2 또는 3	낮음	2 또는 3	높음	4
2 또는 3	중간	1	없음	2
2 또는 3	중간	1	낮음	2
2 또는 3	중간	1	중간	2
2 또는 3	중간	1	높음	3
2 또는 3	중간	2 또는 3	없음	2
2 또는 3	중간	2 또는 3	낮음	2
2 또는 3	중간	2 또는 3	중간	3
2 또는 3	중간	2 또는 3	노은	4
2 또는 3	높음	1	없음	2
2 또는 3	높음	1	낮음	2
2 또는 3	높음	1	중간	2
2 또는 3	높음	1	높음	3
2 또는 3	높음	2 또는 3	없음	2
2 또는 3	높음	2 또는 3	낮음	2
2 또는 3	높음	2 또는 3	중간	3
2 또는 3	높음	2 또는 3	높음	4
2 또는 3	즉시	1	없음	2
2 또는 3	즉시	1	낮음	2
2 또는 3	즉시	1	중간	2
2 또는 3	즉시	1	높음	3
2 또는 3	즉시	2 또는 3	없음	2
2 또는 3	즉시	2 또는 3	낮음	2
2 또는 3	즉시	2 또는 3	중간	3
2 또는 3	즉시	2 또는 3	높음	4
4	없음	1	없음	2
4	없음	1	낮음	2
4	없음	1	중간	2
4	없음	1	높음	3
4	없음	2 또는 3	없음	2
4	없음	2 또는 3	낮음	2
4	없음	2 또는 3	중간	3
4	없음	2 또는 3	높음	4
4	낮음	1	없음	2
4	낮음	1	낮음	2
4	낮음	1	중간	2
4	낮음	1		3
4	<u> </u>	1	<u> </u>	2

보호 감독 지원 등급이 다음에	주요 간병인 위험 등급:	예비 간병인 위험 점수:	행동 중증도:	수혜자의 비조정 IFS 등급:
해당될 경우:		2 77 1 2		
4	낮음	2 또는 3	낮음	2
4	낮음	2 또는 3	중간	3
4	낮음	2 또는 3	높음	4
4	중간	1	없음	2
4	중간	1	낮음	2
4	중간	1	중간	3
4	중간	1	높음	3
4	중간	2 또는 3	없음	2
4	중간	2 또는 3	낮음	3
4	중간	2 또는 3	중간	3
4	중간	2 또는 3	높음	4
4	높음	1	없음	2
4	노승	1	낮음	2
4	높음	1	중간	3
4	높음	1	높음	3
4	높음	2 또는 3	없음	2
4	높음	2 또는 3	낮음	3
4	높음	2 또는 3	중간	4
4	높음	2 또는 3	높음	4
4	즉시	1	없음	2
4	즉시	1	낮음	2
4	즉시	1	중간	3
4	즉시	1	높음	3
4	즉시	2 또는 3	없음	2
4	즉시	2 또는 3	낮음	3
4	즉시	2 또는 3	중간	4
4	즉시	2 또는 3	높음	4
5	없음	1	없음	2
5	없음	1	낮음	2
5	없음	1	중간	3
5	없음	1	높음	4
5	없음	2 또는 3	없음	3
5	없음	2 또는 3	낮음	3
5	없음	2 또는 3	중간	4
5	없음	2 또는 3	높음	5
5	낮음	1	없음	2
5	낮음	1	낮음	2
5	낮음	1	중간	3
5	낮음	1	높음	4
5	낮음	2 또는 3	없음	3
5	낮음	2 또는 3	낮음	3
5	낮음	2 또는 3	중간	4

보호 감독 지원 등급이 다음에 해당될 경우:	주요 간병인 위험 등급:	예비 간병인 위험 점수:	행동 중증도:	수혜자의 비조정 IFS 등급:
5	낮음	2 또는 3	높음	5
5	중간	1	없음	2
5	중간	1	낮음	2
5	중간	1	중간	3
5	중간	1	높음	4
5	중간	2 또는 3	없음	3
5	중간	2 또는 3	낮음	3
5	중간	2 또는 3	중간	4
5	중간	2 또는 3	높음	5
5	높음	1	없음	2
5	높음	1	낮음	2
5	높음	1	중간	3
5	높음	1	높음	4
5	높음	2 또는 3	없음	3
5	높음	2 또는 3	낮음	3
5	높음	2 또는 3	중간	4
5	높음	2 또는 3	높음	5
5	즉시	1	없음	2
5	즉시	1	낮음	2
5	즉시	1	중간	3
5	즉시	1	높음	4
5	즉시	2 또는 3	없음	3
5	즉시	2 또는 3	낮음	3
5	즉시	2 또는 3	중간	4
5	즉시	2 또는 3	높음	5
6	없음	1	없음	2
6	없음	1	낮음	3
6	없음	1	중간	3
6	없음	1	높음	4
6	없음	2 또는 3	없음	3
6	없음	2 또는 3	낮음	3
6	없음	2 또는 3	중간	4
6	없음	2 또는 3	높음	5
6	낮음	1	없음	2
6	낮음	1	낮음	3
6	낮음	1	중간	3
6	낮음	1	높음	4
6	낮음	2 또는 3	없음	3
6	낮음	2 또는 3	낮음	3
6	낮음	2 또는 3	중간	4
6	낮음	2 또는 3	높음	5
6	중간	1	없음	3

보호 감독 지원 등급이 다음에 해당될 경우:	주요 간병인 위험 등급:	예비 간병인 위험 점수:	행동 중증도:	수혜자의 비조정 IFS 등급:
6	중간	1	낮음	3
6	중간	1	중간	3
6	중간	1	높음	4
6	중간	2 또는 3	없음	3
6	중간	2 또는 3	낮음	4
6	중간	2 또는 3	중간	4
6	중간	2 또는 3	높음	5
6	높음	1	없음	3
6	높음	1	낮음	3
6	높음	1	중간	4
6	높음	1	높음	4
6	높음	2 또는 3	없음	4
6	높음	2 또는 3	낮음	4
6	높음	2 또는 3	중간	5
6	높음	2 또는 3	높음	5
6	즉시	1	없음	3
6	즉시	1	낮음	3
6	즉시	1	중간	4
6	즉시	1	높음	4
6	즉시	2 또는 3	없음	4
6	즉시	2 또는 3	낮음	4
6	즉시	2 또는 3	중간	5
6	즉시	2 또는 3	높음	5

- 2. DDA 는 귀하의 개인 및 가족 서비스 등급이 다음과 같이 결정되는 경우 개인 및 가족 서비스 등급에 1 등급을 추가합니다.
  - a) 1 등급, 2 등급, 3 등급 또는 4 등급
  - b) DDA 간병인 상태 중증도에 있는 2 번 질문("장애인, 심한 질환 또는 5 세 이하")에 대해 4 점을 받았을 경우 WAC 388-828-5260을 참고하십시오.

## 제 Ⅲ 부 - IFS 서비스 수혜 숭인 결정

DDA 의료 중증도

## WAC 388-828-5700 DDA 는 어떻게 의료중증도를 결정합니까?

DDA 는 WAC 388-828-4360 에 따라 특별 의료지원 필요 측정도(Exceptional Medical Support Needs Scale)에 있는 질문에 대한 귀하의 SIS 지원 점수를 사용하여 다음 도표에 따라 귀하의 의료 중증도를 결정합니다.

1			
		의료 중증도:	가치기준
	다음 기준에 부합할 경우:		
1.	1, 4 및 7 번 질문에 대한 점수가 2 점일 경우		
		높음	3
2.	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 또는		
	19 번 질문에 대한 점수가 2 점일 경우	높음	3
3.	특별 의료지원 필요 측정도 총점이 8 점 이상일		
	경우	높음	3
4.	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 또는		
	19 번 질문에 대한 점수가 2 점이고 높은 의료 중증도	중간	2
	기준에 부합하지 않을 경우		
5.	특별 의료지원 필요 측정도 총점이 6 점 또는 7 점이고,		
	높은 의료 중증도 기준에 부합하지 않을 경우	중간	2
6.	특별 의료지원 필요 측정도 총점이 5 점 이하이지만 0		
	보다 높고, 15 번을 제외한 모든 번호의 질문에 대한	낮음	1
	점수가 2 점이 되지 않을 경우		
7.	특별 의료지원 필요 측정도 총점이 0 일 경우		
		없음	0

## DDA 의 일상 활동(ADL: Activities of Daily Living) 측정도

#### WAC 388-828-5420 나이가 출생에서 15 세 사이일 경우 DDA 는 어떻게 ADL 지원 필요 점수를 결정합니까?

나이가 출생에서 15 세 사이일 경우 아동용 지원 평가서에 있는 각 ADL 질문에 대한 귀하의 중증도 총점이 귀하의 ADL 지원 필요 점수입니다.

아동용 지원 평가서의 ADL 질문은 WAC 388-828-		
304	0 을 참고하십시오.	
질문#	ADL 질문유형:	
1	스스로 옷을 입고 가꾼다	
2	혼자서 화장실을 사용한다	
3	나이에 맞게 식사를 한다	
4	돌아다닌다	

## WAC 388-828-5440 DDA 는 아동용 지원 평가서에 대한 나의 ADL 지원 필요 점수를 어떻게 사용합니까?

1. DDA 는 귀하의 ADL 지원 필요 점수와 다음 도표를 사용하여 아동용 지원 평가서에 대한 귀하의 ADL 지원 필요 등급을 결정합니다.

귀하의 ADL 지원 필요 점수:	귀하의 ADL 지원 필요 등급:	가치기준
11 ~ 16	높음	3
7 ~ 10	중간	2
2 ~ 6	낮음	1
0 또는 1	없음	0

2. WAC 388-828-3040 에 있는 ADL 질문에 대해 중증도 점수가 4 점일 경우 귀하의 ADL 지원 필요 등급은 높게 결정됩니다.

#### WAC 388-828-5460 16 세 이상일 경우 DDA 에서 어떻게 나의 ADL 지원 필요 점수를 결정합니까?

1. 16 세 이상일 경우 다음 SIS 질문으로부터 조정된 "지원 유형" 총점이 귀하의 ADL 지원 필요 점수입니다.

WAC 388-828-4200 및 WAC 388-828-4280 의		
	SIS 평가서에 의거한 ADL 질문	
질문#	ADL 질문유형:	
A2	목욕 및 개인위생 관리 및 스스로 가꾸기	
A3	화장실 사용하기	
A4	옷입기	
A6	식사하기	
E1	약 복용하기	
E2	보행 및 이동	

- 2. SIS ADL 질문에 대한 "지원 빈번도" 점수가 0 이거나 1 일 경우 그 질문에 대한 "지원 유형" 점수를 0 으로 조정합니다.
- 3. SIS ADL 질문에 대한 "지원 빈번도" 점수가 2, 3, 4 이면 "지원 유형" 점수를 조정할 필요가 없습니다.

보기:

SIS ADL 질문	SIS ADL 질문유형	"지원 빈번도" 점수	"지원 유형" 점수:	조정된 "지원 유형" 점수:
A2	목욕 및 개인위생 관리 및 스스로 가꾸기	1	2	0
A3	화장실 사용하기	3	3	3
A4	옷입기	3	3	3
A6	식사하기			
		1	2	0
E1	약 복용하기	3	2	2
E2	보행 및 이동	0	0	0
SIS ADL 지원	필요 점수:			8

#### WAC 388-828-5480 DDA 는 SIS 평가서에 대한 나의 ADL 지원 필요 등급을 어떻게 결정합니까?

1. DDA 는 귀하의 ADL 지원 필요 점수와 다음 도표를 사용해 SIS 에 대한 귀하의 ADL 지원 필요 등급을 결정합니다(16 세 이상일 경우).

SIS 에 대한 조정된 ADL 지원 필요 총점:	SIS 에 대한 ADL 지원 필요 등급	가치기준
16 ~ 24	높음	3
10 ~ 15	중간	2
2~9	낮음	1
0 또는 1	없음	0

2. WAC 388-828-5460 에 기재된 질문들 중 "지원 유형" 점수가 4 점이 되는 것이 있으면 SIS 평가서에 대한 귀하의 ADL 지원 필요 등급은 높게 결정됩니다.

### 개인 및 가족 서비스 평점

#### WAC 388-828-9060 DDA 는 어떻게 나의 개인 및 가족 서비스 평점을 측정합니까?

1. 귀하의 개인 및 가족 서비스 평점은 다음 도표를 사용해 측정합니다.

비조정 개인 및 가족 서비스 등급이 아래와 같을 경우:	개인 및 가족 서비스 지원 평점은 아래와 같습니다.	
1	0	
2	240	
3	336	
4	432	
5	528	

#### WAC 388-828-9100 DDA 는 IFS 지원 등급 조정에 매기는 번호를 어떻게 결정합니까?

아래에 나와 있는 수혜자의 개인 및 가족 서비스 지원 등급 조율 요소를 DDA 평가로 결정된 기능적으로 MPC 개인위생보호 자격이 없는 수혜자에 대한 개인 및 가족 서비스 지원 등급에 추가합니다.

	ADL 측정			
의학적 측정	없음	낮음	중간	높음
없음	57	57	76	85
낮음	57	57	76	85
중간	57	88	122	145
높음	57	145	245	287

## WAC 388-828-9120 - DDA 는 수혜자의 개인 및 가족 서비스 점수를 어떤 방법으로 결정합니까?

DDA 는 WAC 388-828-9060 에 있는 수혜자의 개인 및 가족 지원 등급을 WAC 388-828-9100 에 있는 조정액에 추가해 수혜자의 개인 및 가족 서비스 점수를 결정합니다.

### WAC 388-828-9140 DDA 는 수혜자의 개인 및 가족 서비스 재정액을 어떻게 결정합니까?

개인 및 가족 서비스 연간 재정액은 다음과 같이 개인 및 가족 서비스 지원 등급에서 결정합니다.

	IFS 연간 할당금	
IFS 점수		IFS 등급
0 - 60	비 재정액	0
61 - 240	\$1,200	1
241 - 336	\$1,800	2
337 - 527	\$2,400	3
528 이상	\$3,600	4